

- Questo è un dispositivo medico ottenibile senza prescrizione medica.
- Leggere con attenzione l'intero foglio illustrativo: contiene informazioni importanti per il consumatore.
- Conservare il foglio illustrativo per poterlo consultare all'occorrenza.
- Per ulteriori informazioni o consigli, rivolgersi al proprio medico e/o farmacista.
- Se la sintomatologia persiste dopo un certo periodo di tempo, consultare il medico.

DIGERFAST®

polvere orosolubile

COMPOSIZIONE

Simeticone, potassio citrato, biossido di silicio, acido citrico, sorbitolo (da mais o frumento), sucralosio, aroma cola, aroma limone.

COME SI PRESENTA

DIGERFAST si presenta in forma di polvere orosolubile. La confezione contiene 24 bustine monodose da 2 g.

CHE COSA È E PERCHÉ SI USA

La sostanza attiva contenuta nelle bustine DIGERFAST polvere orosolubile è il simeticone che riesce a degradare le bolle di schiuma presenti nel tubo digerente (a causa di predisposizione, di alcuni alimenti o di maggiore deglutizione di aria durante il pasto). Il gas così liberato dalle varie bolle viene facilmente espulso dall'organismo in modo naturale, prevalentemente mediante l'aria espirata. Il prodotto è ben tollerato poiché esercita un'azione meccanica all'interno del tubo digerente senza interessare il resto dell'organismo.

INDICAZIONI

Trattamento sintomatico di disturbi gastrointestinali dovuti alla presenza di gas, quali gonfiori di stomaco (aerofagia) e dell'intestino (meteorismo) e dolori ad essi associati (crampi, colon irritabile, eruttazioni, flatulenza).

Trattamento della sintomatologia dispeptica funzionale, caratterizzata da gonfiore allo stomaco e senso di pesantezza dopo i pasti, digestione lenta, eruttazioni frequenti, nausea. Preparazione a esami diagnostici nella regione addominale, quali l'endoscopia oppure l'ecografia e la radiografia per la riduzione dell'opacità dovuta alla presenza di gas.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

DIGERFAST polvere orosolubile non va somministrato a bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni. Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto.

Gravidanza ed allattamento

La sicurezza d'uso di DIGERFAST polvere orosolubile durante la gravidanza e l'allattamento non è stata dimostrata. In tali circostanze, si consiglia di consultare il proprio medico.

INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI

Non sono note interazioni con altri prodotti, pertanto è consigliabile consultare il medico prima di utilizzare DIGERFAST polvere orosolubile in associazione ad altri dispositivi medici o farmaci.

COME DEVE ESSERE UTILIZZATO

Versare direttamente in bocca il contenuto della bustina senza necessità di ingerire acqua. Non ingerire da sdraiati.

QUANDO E PER QUANTO TEMPO DEVE ESSERE UTILIZZATO

- Trattamento sintomatico di disturbi gastrointestinali.
Adulti e adolescenti a partire da 14 anni: 1 o 2 bustine dopo ogni pasto principale, in caso di necessità anche prima del riposo notturno.
Non superare la dose giornaliera di 4 bustine.
- Per la preparazione a esami diagnostici.
Adulti e adolescenti a partire da 14 anni: il giorno prima dell'esame 4 bustine nell'arco della giornata. La mattina dell'esame 1 bustina.

La durata dell'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi. Se necessario ai fini della risoluzione dei sintomi, DIGERFAST polvere orosolubile può essere assunto per periodi prolungati. In ogni caso, qualora non sia stato consultato un medico, non prolungare l'uso per oltre 4 settimane consecutive.

In caso di disturbi addominali persistenti e recidivi, consultare il medico per identificare le cause dei disturbi.

EFFETTI INDESIDERATI

Non sono noti effetti indesiderati legati all'assunzione di DIGERFAST polvere orosolubile. Qualora si riscontrassero effetti indesiderati, informare il proprio medico o il farmacista.

AVVERTENZE

In caso di intolleranza agli zuccheri consultare il medico prima di assumere DIGERFAST polvere orosolubile. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.

SCADENZA, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

La data di scadenza è indicata sulla confezione e sulle singole bustine; si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. Conservare il dispositivo medico ben chiuso, in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e dal calore. Chiedere al farmacista come smaltire il dispositivo medico scaduto o non più utilizzato.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti:

- Astuccio (**PAP 21**) e foglio illustrativo (**PAP 22**): Raccolta carta.
- Bustina (**C/LDPE 90**): Raccolta plastica.

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

DISPOSITIVO MEDICO 0373

Data di emissione ultima versione delle istruzioni per l'uso: Marzo 2021.



Fabbricante: FARMA-DERMA s.r.l.

Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA

Per segnalazioni: www.farmaderma.it (Contatti/Assicurazione Qualità)